

冻干皮内注射用卡介苗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/315/2021\\_2022\\_\\_E5\\_86\\_BB\\_E5\\_B9\\_B2\\_E7\\_9A\\_AE\\_E5\\_c22\\_315230.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E5_86_BB_E5_B9_B2_E7_9A_AE_E5_c22_315230.htm)

药品名称冻干皮内注射用卡介苗 类别菌苗说明本品系卡介苗经冷冻干燥制成，专供皮内注射预防结核病，严禁皮下或肌肉注射！用法用量（1）接种对象为出生3个月以内的婴儿或用5iu稀释旧结核菌素或5iu ppd（结核菌素蛋白衍化物）试验阴性（结素或ppd试验后48～72小时局部硬结在5mm以下者）的儿童。（2）菌苗稀释，用灭菌的1ml注射器将随制品附发的稀释液定量加入冻干皮内注射用卡介苗安瓶中，放置约1分钟，摇动安瓶使之溶化后，用注射器往返抽动数次，使充分混匀。每支安瓶自稀释时起，必须在半小时内用完，以防污染。（3）接种方法，先用75%酒精消毒上臂外侧三角肌中部略下处皮肤，然后用灭菌的1ml蓝心注射器（25～26号针头）吸取摇匀的菌苗，皮内注射0.1ml。注重事项（1）接种后2周左右，局部可出现红肿浸润，若随后化脓，形成小溃疡，可用1%龙胆紫涂抹，以防感染。一般8～12周后结痂。如遇淋巴结肿大可热敷处理，如已软化形成脓疮，可用灭菌注射器抽脓。如已穿孔，则请医生诊治。（2）凡患有结核病、急性传染病、肾炎、心脏病、湿疹、免疫缺陷病或其他皮肤病者均不得接种。（3）接种对象必须具体登记，包括姓名、性别、年龄、住址、菌苗批号及亚批号、制造单位和接种日期等。（4）注射器要专用，不得用作其他注射，以免产生化脓反应。（5）使用时注重避光。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)