

麻疹疫苗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/315/2021\\_2022\\_\\_E9\\_BA\\_BB\\_E7\\_96\\_B9\\_E7\\_96\\_AB\\_E8\\_c22\\_315231.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E9_BA_BB_E7_96_B9_E7_96_AB_E8_c22_315231.htm) 药品名称麻疹疫苗  
物别名冻干麻疹减毒活疫苗 Freeze Dried Measles Vaccine Live  
英文名称Measles Vaccine 类别疫苗制剂粉针剂或注射液

: 1ml(5人份)。适应症预防麻疹。不良反应接种后5~10天可出现发热和皮疹等全身反应，一般仅持续1~2日即消失。用法用量上臂外侧三角肌附着处皮下注射，0.2ml/次。冻干品以注射用水充分溶解后使用，并于半小时内用完，剩余的应弃去。注重事项有家族发热惊厥史或儿童曾发生过发热致惊厥者，接种后应采取预防发热的治疗措施。对卵蛋白有严重过敏史的人，需进行卵蛋白和疫苗皮试，阳性者按脱敏方法接种。注射过丙种球蛋白者，应过两个月后再行接种，因丙种球蛋白影响疫苗的免疫效能。发热，急性传染病等患者应推迟接种，接种本品后3个月内不宜妊娠，孕妇禁用本品。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)