

炭疽活菌苗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E7_82_AD_E7_96_BD_E6_B4_BB_E8_c22_315240.htm 药品名称炭疽活菌苗
类别菌苗说明本品系用弱毒炭疽菌株制成的50%甘油活芽胞悬液。专供预防炭疽之用，严禁注射！用法用量（1）接种对象为炭疽病常发地区人群、皮毛加工与制革工人、放牧员以及其他与牲畜密切接触者。应半年或1年接种1次。（2）用消毒注射器吸取菌苗，在消毒过的上臂外侧上部滴菌苗两滴，相距3~4cm。划痕时用手将皮肤绷紧，用消毒划痕针在每滴菌苗处作井字划痕，每条痕长约1~1.5cm。划破皮肤以出现间断小血点为度。（3）用同一划痕针反复涂压，使菌苗充分进入划痕处。接种后局部应裸露至少5~10分钟，然后用消毒干棉球擦净。（4）接种后24小时划痕部无任何反应者应重新接种。注重事项（1）患严重疾病、免疫缺陷病、严重皮肤病患者，用免疫抑制剂治疗者，有严重过敏史者，不予接种。（2）本品严禁注射用。（3）用前应将菌苗充分摇匀。消毒皮肤只用酒精，不用碘酒。（4）菌苗安瓶启开后，应于3小时内用完。（5）剩余菌苗、空安瓶及用具，需用3%碱（ Na_2CO_3 ）水煮沸消毒30分钟。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com