

硫酸新霉素滴眼液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/315/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A1\\_AB\\_E9\\_85\\_B8\\_E6\\_96\\_B0\\_E9\\_c22\\_315251.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E7_A1_AB_E9_85_B8_E6_96_B0_E9_c22_315251.htm)

药品名称硫酸新霉素滴眼液 英文名称Neomycin Sulfate Eye dro&#112.s 类别眼科用药制剂本品为无色或微黄色的澄明液体。8ml(4万单位)。药理毒理新霉素是一种氨基糖苷类抗生素。本品对葡萄球菌属(甲氧西林敏感株)、棒状杆菌属有良好作用，对大肠埃希菌、克雷伯菌属、变形杆菌属等肠杆菌科细菌亦有良好作用，对各组链球菌、肺炎链球菌、肠球菌属等活性差，铜绿假单胞菌、厌氧菌等对本品耐药。细菌对链霉素、新霉素、卡那霉素和庆大霉素间有部分或完全交叉耐药。药动学硫酸新霉素滴眼液滴眼后很少被吸收入眼内组织或全身血液循环。适应症由敏感葡萄球菌属(甲氧西林敏感金葡菌和凝固酶阴性葡萄球菌)、流感嗜血杆菌、大肠埃希菌、变形杆菌属等敏感革兰阴性杆菌所致结膜炎、泪囊炎、角膜炎、眼睑炎、睑板腺炎等。不良反应偶有眼部轻度刺激不适，无全身不良反应。用法用量滴入眼结膜囊内，一次1~2滴，一日3~5次。注重事项对新霉素或其他氨基糖苷类抗生素过敏的患者禁用。1. 本品不得直接注入球结膜下或眼前房内。2. 泪囊感染(泪囊炎)常发生于泪囊管闭塞的儿童，除用本品滴眼外，可同时辅以局部热敷。3. 滴眼时瓶口勿接触眼睛，使用后将瓶盖拧紧，以免污染药液。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)