

利福定滴眼液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E5_88_A9_E7_A6_8F_E5_AE_9A_E6_c22_315275.htm 药品名称利福定滴眼液
药物别名异丁哌力复霉素、异丁基哌嗪力复霉素 FRD、Isobutyl Piperazine Rifamycin Rifandinum 英文名称Rifandin 类别眼科用药制剂滴眼液：0.05%。分子式成分化学名：3-(4-异丁基-1-哌嗪基)力复霉素SV。分子式：C₃₇H₄₇NO₁₂。分子量：697.79。性状：利福定为砖红色结晶性粉末，无臭，味微苦。本品极微溶于水，微溶于甲醇，易溶于氯仿。药理毒理利福定是半合成的利福霉素类药，为一种广谱杀菌剂。利福平分子哌嗪基上的甲基为异丁基取代即为利福定。本品为利福平的同系物，对结核杆菌及麻风杆菌比利福平有更强的抑制作用；与异烟肼、对氨基水杨酸钠、乙胺丁醇及氨硫脲等合用，可加强抗结核作用，并延迟耐药菌的产生。利福定作用机制与利福平相同，通过与依靠于DNA的RNA多聚酶的 亚单位牢固结合，抑制细菌RNA的合成，防止该酶与DNA连接，从而阻断RNA转录过程。本品在宿主细胞内、外均有明显的杀菌作用。抗菌谱：利福定抗菌谱与利福平相似，对沙眼病毒也有抑制作用。利福定对结核杆菌的抑菌作用比利福平强3倍，与利福平有交叉耐药性。适应症沙眼、急性结膜炎及病毒性角膜炎等。用法用量眼部疾病采用局部给药 注重事项本品对胎儿的影响尚未阐明，因此，孕妇及5岁以下小儿慎用、肝、肾功能不良者及孕妇应慎用。本品可由乳汁排泄，哺乳期妇女应慎用。需定期检查血、尿常规。利福定与其它利福霉素类药有交叉过敏。对利福定及其它利福霉素类药过敏者禁用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细

请访问 www.100test.com