

脊髓灰质炎疫苗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/315/2021\\_2022\\_\\_E8\\_84\\_8A\\_E9\\_AB\\_93\\_E7\\_81\\_B0\\_E8\\_c22\\_315294.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E8_84_8A_E9_AB_93_E7_81_B0_E8_c22_315294.htm) 药品名称脊髓灰质炎疫苗 药物别名小儿麻痹症活疫苗，脊髓灰质炎口服活疫苗 Poliomylitis Vaccine Live 英文名称Poliomyelitis Vaccine 类别疫苗 制剂糖丸：单价糖丸 型红色， 型黄色， 型绿色；三价糖丸白色；口服液：三价活疫苗。适应症麻痹性脊髓灰质炎的常规预防，使用对象主要为儿童。不良反应可出现发热、头痛、腹泻等，偶有皮疹，2~3天后自行痊愈。极少数发生的严重不良反应为疫苗相关性麻痹病。用法用量口服糖丸剂：婴儿一般于第2、4、6月龄时各服一丸。1.5岁~2岁，4岁和7岁时再各服1丸（直接含服或以凉开水溶化后服用）。口服液体疫苗：初期免疫3剂，从出生第2个月开始，每次2滴，间隔4周~6周，于4岁或入学前加强免疫1次，可直接滴于婴儿口中或滴于饼干上服下。注重事项若有发热、体质异常虚弱、严重佝偻病、活动性结核及其他严重病疾以及1周内每日腹泻4次者均应暂缓服用。HIV感染、异常丙种球蛋白血症、淋巴瘤、白血病、广泛性恶性病变以及其他免疫缺陷者（如服用皮质激素、抗癌药、免疫抑制药或接受辐射等）均属禁忌。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)