

吸附霍乱菌苗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E5_90_B8_E9_99_84_E9_9C_8D_E4_c22_315306.htm 药品名称吸附霍乱菌苗 类别菌苗说明本品系用霍乱弧菌古典型、el-tor型分别培育、杀菌后，经稀释成所需浓度加氢氧化铝吸附制成。用于预防霍乱、副霍乱。用法用量（1）重点用于港口、铁路沿线工地工作人员，下水道、粪便、垃圾处理人员，饮食业、医务防疫人员，水上居民，旅游者及旅游服务人员，以及卫生条件较差的地区、霍乱流行的地区和流行感染威胁地区的人群。（2）肌肉注射于上臂外侧三角肌处。（3）初次注射本菌苗者需注射2次，间隔4~8周。注射用量如下：6周岁以下6周岁以上 第1针0.3ml 第1针0.5ml 第2针0.3ml 第2针0.5ml 每年于流行季节前再加强1次，用量与第2针同。注重事项（1）发热，严重高血压，心、肝、肾脏病及活动性结核，孕妇，月经及哺乳妇女，有过敏反应病史者均禁用。（2）注射本品一般无反应，有的接种部位有红肿、疼痛，或有低热、倦怠、头痛等，一般不需处理即行消退。如有严重反应，应及时诊治。（3）本品加有吸附剂，易沉淀，每次吸取前轻轻摇匀，避免菌苗浓淡不均，吸入针管后如放置时间稍长，须摇匀后再注射。（4）注射部位须严密消毒，注射用量、部位均应准确无误。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com