

小蓟（刺儿菜）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E5_B0_8F_E8_93_9F_EF_BC_88_E5_c22_315309.htm 药品名称小蓟（刺儿菜）药物别名野红花、小刺盖、刺菜。英文名称Common Cephalanoplos Herb 类别止血药图片来源为菊科植物刺儿菜Cephalanoplos segetum (Bunge) Kitam.的地上部分。采制夏、秋季采收，洗净晒干或鲜用。植物形态多年生草本，高25~50cm，具匍匐根茎。茎竖立，有纵槽，幼茎被白色蛛丝状毛。叶互生，椭圆形或长椭圆状披针形，长7~10cm，宽1.5~2.5cm，先端钝，边缘齿裂，有不等长的针刺，两面均被蛛丝状绵毛。头状花序顶生，雌雄异株；总苞钟状，总苞片5~6层，雄花序总苞长1.8cm，雌花序总苞长约2.3cm；花管状，淡紫色，雄花花冠长1.7~2cm，雌花花冠长约2.6cm。瘦果椭圆形或长卵形，具纵棱，冠毛羽状。花期5~6月，果期5~7月。生长地生于荒地、路旁或田间。产于全国各地。化学成分含刺槐甙（acaciin）、芸香甙、原儿茶酸、咖啡酸、氯原酸、生物碱、抑甙。性味归经性凉，味甘、苦。功用主治凉血止血，祛瘀消肿。用于衄血、吐血、尿血、便血、崩漏下血、外伤出血、痈肿疮毒。剂量10~30克。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com