

大黄(川军、锦纹) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E5_A4_A7_E9_BB_84__E5_B7_9D_c22_315323.htm 药品名称大黄(川军、

锦纹)药物别名葵叶大黄、北大黄、天水大黄。英文名称Radix et Rhizoma Rhei 类别攻下药性状本品类圆柱形，圆锥形或不规则块状，长3~17cm，直径3~10cm，除尽外皮者表面黄棕色至红棕色，有的有类白色网状纹理及星点散在。质坚实，断面淡红棕色或黄棕色，颗粒性，根茎髓部宽广，有星点，根木部发达、无星点。气清香，味苦而微涩。分子式成分蒽醌甙及游离蒽醌衍生物，后者包括大黄酸(rhein)、大黄素(emodin)、大黄酚(chrysonhanol)、芦荟大黄素

(aloe-emodin)、大黄素甲醚(phycion)等。图片来源为蓼科植物掌叶大黄Rheum palmatum L.的根茎和根。采制秋末采挖，除去细根，刮去外皮，切瓣或段，干燥。植物形态多年生草本，高达2m。基生叶宽卵形或近圆形，长、宽达35cm，掌状5~7中裂，裂片窄三角形，叶柄粗壮；茎生叶互生，较小；托叶鞘大，膜质，淡褐色。大圆锥花序顶生；花小，红紫色，花被片6。瘦果三棱形，具翅。花期6~7月，果期7~8月。功用主治(1)攻积泻火：用于热盛之便秘。峻下宜生用，缓下宜熟用。配芒硝、枳实、厚朴，治实热结滞之便秘。(2)解毒，祛瘀：用于热毒炽盛之菌痢、痈肿，血热妄行之吐血、衄血以及瘀血肿块。配桃仁、红花治血瘀经闭。配茵陈、栀子治阳黄。剂量5~10克。生用或后下之力大；熟用或久煎则力缓。大黄炭用于止血。附方同属植物唐方特大黄R.tanguticum Maxim. ex Balf.、药用大黄R.offic-inaleBaill.

的根和根茎同作大黄入药。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com