

卡那霉素滴眼液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/315/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8D\\_A1\\_E9\\_82\\_A3\\_E9\\_9C\\_89\\_E7\\_c22\\_315338.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E5_8D_A1_E9_82_A3_E9_9C_89_E7_c22_315338.htm) 药品名称卡那霉素滴眼液 英文名称Kanamycin Sulfate Eye dro&#112.s 类别眼科用药 制剂本品为无色或微黄色的澄明液体。8ml：40mg分子式成分硫酸卡那霉素，为一种多组分抗生素，含A、B、C三种组分，主要成分为A。药理毒理卡那霉素是一种氨基糖苷类抗生素。对多数肠杆菌科细菌，如大肠埃希菌、克雷伯菌属、变形杆菌属、肠杆菌属、志贺菌属、沙门菌属、枸橼酸杆菌属、普罗菲登菌属、耶尔森菌属等均有良好作用；流感杆菌、布鲁菌属、脑膜炎球菌、淋球菌等对本品也大多敏感，对铜绿假单胞菌无效。对葡萄球菌属中甲氧西林敏感株和结核分枝杆菌也有一定作用，其他革兰阳性细菌如溶血性链球菌、肺炎链球菌、肠球菌和厌氧菌等对本品多数耐药。卡那霉素主要与细菌核糖体30S亚单位结合，抑制细菌蛋白质的合成。卡那霉素与链霉素、新霉素有完全交叉耐药，与其他氨基糖苷类可有部分交叉耐药。药动学本品滴眼后很少吸收进入眼内组织或进入全身血液循环。适应症敏感大肠埃希菌、克雷伯菌属、变形杆菌属、淋病奈瑟菌及葡萄球菌属等细菌所致结膜炎、角膜炎、泪囊炎、眼睑炎、睑板腺炎等感染。不良反应偶有眼部轻度刺激不适，无全身不良反应。相互作用1．与其他氨基糖苷类合用或先后局部应用，可增加耳毒性、肾毒性以及神经肌肉阻滞作用。2．与卷曲霉素、顺铂、依他尼酸、呋塞米或万古霉素(或去甲万古霉素)等合用，或先后连续局部应用，可能增加耳毒性与肾毒性。3．与头孢噻

吩或头孢唑啉局部合用可能增加肾毒性。4. 其他肾毒性药物及耳毒性药物与本品合用或先后应用应慎重，以免加重肾毒性或耳毒性。用法用量滴入眼结膜囊内，一次1~2滴，一日3~5次。注重事项对本品或其他氨基糖苷类过敏者禁用。1. 本品不得直接注入球结膜下或眼前房内。2. 泪囊感染(泪囊炎)常发生于泪囊管闭塞的儿童，除用本品滴眼外，可同时辅以局部热敷。3. 滴眼时瓶口勿接触眼睛，使用后应将瓶盖拧紧，以免污染药液。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)