

流行性斑疹伤寒疫苗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E6_B5_81_E8_A1_8C_E6_80_A7_E6_c22_315358.htm 药品名称流行性斑疹伤寒疫苗 类别疫苗说明本品系用流行性斑疹伤寒立克次体滴鼻感染小白鼠，取肺经研磨后加甲醛溶液将立克次体杀死，经纯化浓缩制成。用于预防斑疹伤寒。用法用量（1）重点使用于有本病流行地区的人群。（2）皮下注射于上臂外侧三角肌附着处。（3）初次注射本疫苗者，需注射3次，每次间隔5~10天。注射用量：1）15岁以上：第1针0.5ml，第2针1.0ml，第3针1.0ml。2）15岁以下：第1针0.3~0.4ml，第2针0.6~0.8ml，第3针0.6~0.8ml。1年后进行加强免疫，注射剂量与第3针相同。注重事项（1）患有急性疾病及高热者；有显著症状的肾炎、糖尿病、活动性肺结核及心脏病者；妊娠后半期及月经者；过敏体质及有支气管哮喘史者，均不得注射。（2）注射后反应稍微，注射部位略有短暂疼痛或轻度红肿。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com