

牵牛子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/315/2021\\_2022\\_\\_E7\\_89\\_B5\\_E7\\_89\\_9B\\_E5\\_AD\\_90\\_c22\\_315386.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E7_89_B5_E7_89_9B_E5_AD_90_c22_315386.htm) 药品名称牵牛子 药物别名黑丑、白丑、二丑、喇叭花。英文名称pharbitis Seed 类别逐水药 性状种子似橘瓣状，长4~8mm，宽3~5mm。表面灰黑色（黑丑）或淡黄白色（白丑）。背面有1条浅纵沟，腹面接线的近端处有1点状种脐，微凹。质硬，浸水中作龟裂状胀破，内有浅黄色子叶两片，紧密重叠而皱曲。味辛、苦，有麻感。图片来源为旋花科植物圆叶牵牛pharbitis purpurea (L.)Voight的种子。采制秋末果实成熟、果壳未开裂时采割植株，晒干，打下种子，除去杂质。植物形态一年生缠绕草本，全株密被白色长毛。叶互生，阔心形，全缘；叶柄与总花梗近等长。花序有花1~3朵；萼片5深裂，裂片卵状披针形，长约1cm，先端尾尖；花冠白色、蓝紫色或紫红色，漏斗状，长5~8cm；雄蕊5；子房3室。蒴果球形。种子5~6粒，卵形，黑色或淡黄白色。花期6~9月，果期7~10月。生长地生于山野灌丛中、村边、路旁；多栽培。全国各地有分布。化学成分含牵牛子甙（pharbitin）、牵牛子酸C、D（pharbitic acid C,D）、顺芷酸（tiglic acid）、尼里酸（nilic acid）等。性味归经性味 性寒，味苦；有毒 功用主治(1)泻下逐水：用于水肿、腹水、小便不利之实证。(2)消痰驱蛔：用于痰饮咳喘，常配杏仁、厚朴、葶苈子。驱蛔虫常配槟榔。剂量3~10克。研粉服每次1.5~3克。附方同属植物裂叶牵牛P. nil(L.)Choisy的种子亦作牵牛子入药。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)