

芫花 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E8_8A_AB_E8_8A_B1_c22_315388.htm

药品名称芫花 药物别名杜芫、老鼠花、黄阳花、野丁香花。英文名称Lilac Daphne Flower Bud 类别逐水药 性状常3~7朵生于短花轴上，基部有苞片1~2片，多脱落为单朵。单朵为棒状，多弯曲，长1~1.7cm，直径约为1.5mm；花被筒表面淡紫色或灰绿色，密被短柔毛，先端4裂呈花冠状，裂片淡紫色或黄棕。质软。气微，味甘、微辛。图片来源为瑞香科植物芫花 *Daphne genkwa* Sieb. et Zucc. 的花蕾。采制春季花未开放时采收，除去杂质，干燥。植物形态落叶灌木，高达1m。茎略带紫褐色，幼时有柔毛。叶对生，有的互生，椭圆形，长3~6cm，宽1.5~2cm，下面有绢状毛。花先叶开放，3~7朵簇生于叶腋；花被筒状，先端4裂，淡紫色，外被白色短柔毛；雄蕊8，上下2轮，生于花被筒内；子房1室，瓶状，被白色柔毛，柱头头状，红色。核果肉质，白色。种子1粒。花期4~5月，果期6月。生长地生于路旁及山坡林间。分布于长江流域以南及山东、河南、陕西。化学成分含芫花素（genkwanin）、芹菜素（apigenin）、羟基芫花素、芫花瑞香素（genkwabaphnin）、淡黄木樨草甙、淡黄木樨草甙-7-甲醚。性味归经性味 性寒，味苦，辛。功用主治泻水逐饮，解毒杀虫。用于水肿胀满、胸腹积水、痰饮积聚、气逆喘咳、二便不利、疥癣秃疮、冻疮。剂量汤剂，1.5~3克；散剂，0.5~1克。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com