

使君子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E4_BD_BF_E5_90_9B_E5_AD_90_c22_315390.htm 药品名称使君子 药物别名留球子、索子果。英文名称Rangoon creeper Fruit 类别逐水药 性状果实椭圆形或卵圆形，具5条纵棱，偶有4~9棱，长2.5~4cm，直径约2cm。表面黑褐色至紫黑色，平滑，微具光泽。顶端狭长，基部钝圆，有明显圆形的果梗痕。质坚硬，横切面多于五角星状，棱角处壳较厚。种子长椭圆形或纺锤形，长约2cm，直径约1cm；表面棕褐色或黑褐色，有多数纵皱纹；种皮薄，易剥离；子叶2，黄白色，有油性，断面有裂纹。气微香，味微甜。图片来源为使君子科植物使君子 *Quisqualis indica* L. 的果实。采制秋季果皮变紫黑时采收，除去杂质，干燥。植物形态落叶攀援状灌木。叶对生，长椭圆形至椭圆状披针形，长5~13cm，宽2~6cm，两面有黄褐色短柔毛；叶柄被毛，宿存叶柄基部呈刺状。伞房状穗状花序顶生；萼筒细管状，长约6cm，先端5裂；花瓣5，长圆形或倒卵形，白色后变红色，有香气；雄蕊10，2轮；子房下位，1室，花柱丝状。果实橄榄状，黑褐色。花期5~9月，果期6~10月。生长地生于平地、山坡、路旁等向阳灌丛中，亦有栽培。主产四川、福建、广东、广西。化学成分含使君子氨酸 (quisqualic acid)、葫芦巴碱 (trigonelline)、-脯氨酸、-天冬素等。性味归经性温，味甘功用主治驱虫，消积：用于蛔虫、蛲虫及小儿疳积(腹胀、腹痛、食少面黄)。杀虫消积。用于蛔虫病、蛲虫病、虫积腹痛、小儿疳积。剂量6~10克。小儿每岁1粒半，一日总量不超过20粒。空腹连服2~3天。去壳去仁，水煎或炒香嚼服。 100Test 下载频道开

通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com