

赤小豆 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E8_B5_A4_E5_B0_8F_E8_B1_86_c22_315504.htm

药品名称赤小豆 药物别名红豆、野赤豆 英文名称Semen Phaseoli, Adsuki Bean 类别利水渗湿药 性状种子矩圆形，两端较平截，长5~7mm，直径4~6mm。表面暗红色，有光泽，侧面有白色线性种脐，长约4mm，不突起。子叶两片肥厚，乳白色。来源为豆科植物赤豆Phaseolus angularis Wight的种子。采制秋季荚果成熟而未开裂时拔取全株，晒干，打下种子。植物形态一年生竖立草本，高可达90cm。茎上有显著的长硬毛。三出复叶互生；顶生小叶卵形，长5~10cm，宽2~5cm，先端渐尖，侧生小叶偏斜，全缘或3浅裂，两面疏被白色柔毛；托叶卵形。总状花序腋生；花萼5裂；花冠蝶形，黄色，旗瓣具短爪，龙骨瓣上部卷曲；雄蕊10，二体。荚果圆柱形，长5~8cm。种子6~8粒。花期6~7月，果期7~8月。全国各地普遍栽培。主产吉林、北京、天津、河北、陕西、山东、安徽、江苏、浙江、江西、广东、四川。化学成分含 -、 -球朊（， -globulin）、脂肪酸、烟酸、糖类，维生素A1、B1、B2，植物甾醇、三萜皂甙等。性味归经性平，味甘、酸。功用主治利水消种，解毒排脓。用于水肿胀满、脚气浮肿、黄疸尿赤、风湿热痹、痈肿疮毒、肠痈腹痛。剂量9~30克。 100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com