

苍耳子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E8_8B_8D_E8_80_B3_E5_AD_90_c22_315638.htm 药品名称苍耳子药物别名野茄子、刺儿棵、疗疮草、粘粘葵。英文名称Siberian Cocklebur Fruit 类别果实类图片来源为菊科植物苍耳*Xanthium sibiricum* Patr. 的带总苞的果实。采制9~10月割取地上部分，打下果实，晒干，去刺，生用或炒用。植物形态一年生草本，高30~90cm。茎粗糙，有短毛。叶互生，三角状卵形，长6~10cm，宽5~10cm,先端锐尖，基部心形。边缘有缺刻或3~5浅裂，有不规则粗锯齿，两面有粗毛；叶柄长3~11cm。头状花序顶生或腋生，雌雄同株，雄花序在上，球形，花冠筒状，5齿裂；雌花序在下，卵圆形，外面有钩刺和短毛。花期7~10月，果期8~11月。生长地生于荒地、山坡等干燥向阳处。分布于全国各地。化学成分含苍耳甙(xanthostrumarin)。叶含苍耳醇(xanthanol)、异苍耳醇(jsoxanthanol)、苍耳酯(xanthumin)等。性味归经纺锤形或椭圆形，长1~1.5cm，直径0.4~0.7cm。表面黄棕色至黄绿色，有钩刺。顶端有2枚粗刺，基部有梗痕。质硬而韧，2室，各有1枚瘦果，呈纺锤形，一面较平坦，顶端具1突起的花柱基，果皮薄，灰黑色，具纵纹。种皮膜质，浅灰色，子叶2枚，有油性。气微，味微苦。性温，味辛、苦。功用主治散风湿，通鼻窍。用于风寒头痛、鼻渊流涕、风疹瘙痒、湿痹拘挛。附注苍耳全草亦供药用，治急、慢性胃肠炎，菌痢。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com