

南鹤虱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E5_8D_97_E9_B9_A4_E8_99_B1_c22_315766.htm 药品名称南鹤虱药物别名虱子草、野胡萝卜子。英文名称Wild Carrot Fruit 类别果实类图片来源为伞形科植物野胡萝卜 *Daucus carota* L.的果实。采制秋季果实成熟时割取果枝，晒干，打下果实，除去杂质。植物形态二年生草本，高15~120cm，全株有粗硬毛。基生叶长圆形，2~3回羽状分裂，最终裂片线形至披针形，长2~14mm，宽0.4~2mm。复伞形花序顶生，总花梗长10~60cm；总苞片多数，羽状分理解；伞幅多数；小总苞片5~7，线形；花梗15~25；花白色，在小伞形花序中心的花呈紫色。双悬果卵圆形，棱有狭翅，翅上密生短钩刺。花期5~7月，果期7~8月。生长地生于山野草丛中。主产江苏、河南、湖北、浙江。化学成分含细辛醚、细辛醛、没药烯（*disabolene*）、胡萝卜醇、胡萝卜烯醇、巴豆酸（*tiglic acid*）、牻牛儿醇（*eraniol*）等。性味归经果实为双悬果，椭圆形，多裂为分果。分果长3~4mm，宽1.5~2.5mm；表面淡绿棕色或棕黄色，先端有花柱残基，基部钝圆；背面隆起，具4条突起的棱线，沿棱线密生1列黄白色的钩刺，刺长约1.5mm，棱线间的凹下处散生短柔毛。体轻。搓碎时有特异香气，味微辛劳。性平，味苦、辛。功用主治杀虫消积。用于蛔虫、蛲虫、绦虫病，虫积腹痛、小儿疳积。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com