

羊角拗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E7_BE_8A_E8_A7_92_E6_8B_97_c22_316009.htm 药品名称羊角拗药物别名羊角扭、断肠草、打破碗花。英文名称Divaricate

Strophanthus Seed 类别果实类图片来源为夹竹桃科植物羊角

拗Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook.et Arn. 的种子。采制秋

季采收成熟果实，剥去果皮，将种子除去冠毛，晒干。植物

形态竖立或攀援状灌木，高达2m，有白色乳汁。茎、枝棕褐

色，密生白色皮孔。叶对生，长椭圆形或椭圆状矩圆形，长4

~ 10cm，宽1.5 ~ 5cm。聚伞花序顶生；花萼5裂，内面有腺体

；花冠黄色，漏斗状，5裂，裂片先端延长成1长尾带，长

达10cm，花冠喉部具10枚舌状鳞片；雄蕊5；心皮2，离生。

骨突果叉生。花期3 ~ 4月，果期8 ~ 9月。生长地生于荒野、

坡地、疏林下或灌丛中。主产广东、广西、福建、贵州。化

学成分含羊角拗甙 (divaricoside)、辛诺甙 (sinoside)、D-

毒毛旋花子甙* 、 、 (D-strophanthin- 、 、)等

。性味归经种子纺锤形或狭长披针形，长1 ~ 2.7cm，宽2

~ 4mm，一端狭尖，另端钝圆，有扁平的短翼；深棕色，光

滑无毛，具细纵纹，隆起的一面有浅色种脊，自尖端芒基向

下延伸，达种子长度的2/3或更长，种脊近尖端处有明显突起

的种脐。质脆，易折断，断面胚乳与子叶均富油质。气微，

味苦。性寒，味苦；有大毒。功用主治强心，消肿，止痒杀

虫。用于风湿痛、小儿麻痹后遗症、多发性脓肿、毒蛇咬伤

、跌打、骨折。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下

载。详细请访问 www.100test.com