

疾藜 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022_E7_96_BE_E8_97_9C_c22_316254.htm 药品名称疾藜药物别名硬疾藜、蒺藜子、刺蒺藜。英文名称Puncturervine Caltrop Fruit 类别果实类图片来源为蒺藜科植物蒺藜Tribulus terrestris L.的果实。采制秋季果实成熟时，割取全株，晒干，打下果实，除去杂质。植物形态一年生匍匐草本，多分枝，全株有柔毛。羽状复叶互生或对生；小叶5~7对，长椭圆形，长6~15mm，宽2~5mm，基部常偏斜，有托叶。花单生于叶腋；萼片5；花瓣5，黄色，早落；雄蕊10，5长5短；子房上位，5室，柱头5裂。花期6~7月，果实8~9月。生长地生于田野、路旁及河边草丛。各地均产。主产河南、河北、山东、安徽、江苏、四川、山西、陕西。化学成分含甾体皂甙，其皂甙元为薯蓣皂甙元（diosgenin）、鲁期可皂甙元（ruscogenin）、海可皂甙元（hecogenin）、吉托皂甙元（gitoogenin）等，另含蒺藜甙（tribuloside）、山柰酚-3-芸香糖甙

（kaempferol-3-rutinoside）、紫云英甙（astragalin）、哈尔满碱（harmine）等性味归经果实由5个分果瓣组成，呈放射状排列，直径7~12mm。常裂为单一的分果瓣，分果瓣呈斧状，长3~6mm.背部黄绿色，隆起，有纵棱及多数小刺，并有对称的长刺和短刺各1对。质坚硬。味苦、辛。性微温，味辛、苦。功用主治平肝解郁，活血祛风，明目，止痒。用于头痛眩晕、胸胁胀痛、乳闭乳痛、目赤翳障、风疹瘙痒。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com