

川贝母太白贝母 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E5_B7_9D_E8_B4_9D_E6_AF_8D_E2_c22_316267.htm 药品名称川贝母太白贝母

药物别名尖贝。英文名称Bulbus Fritillariae

Taipaiensis, Taipei Fritillary Bulb 类别根茎类性状鳞茎扁卵圆形或圆锥形，直径0.6~1.2cm，高4~8mm。表面白色，较光滑。

外层两枚鳞叶近等大，顶端开裂，底部平整。味苦。图片来源为百合科植物太白贝母*Fritillaria taipaiensis* P.Y. Li的鳞茎。

采制同暗紫贝母。植物形态多年生草本，高30~40cm。鳞茎

直径1~1.5cm。叶对生，有的中部兼3~4枚轮生或散生，条形至条状披针形，长5~10cm，宽3~7(~12)mm，先端有的

稍弯曲。花单朵，每花有3枚叶状苞片，苞片先端有时稍弯曲，但绝不卷曲；花被片6，长3~4cm，绿黄色，无方格斑，

通常仅在花被片先端近两侧边缘有紫色斑带；外轮3片狭倒卵状矩圆形，宽9~12mm，先端浑圆；内轮3片近匙形，上部

宽12~17mm，基部宽3~5mm，先端骤凸而钝，蜜腺窝几不凸出或稍凸出；花药近基着，花丝通常具小乳突；花柱分裂

部分长3~4mm。蒴果长1.8~2.5cm，棱上的狭翅宽0.5~2mm。

花期5~6月，果期6~7月。生长地生于海拔2400~3150m的山坡草丛中或水边，主产陕西、甘肃、四川、湖北。化学成分含生物碱等。

性味归经同暗紫贝母。功用主治同暗紫贝母。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com