

花椒 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/316/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8A\\_B1\\_E6\\_A4\\_92\\_c22\\_316327.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E8_8A_B1_E6_A4_92_c22_316327.htm) 药品名称花椒 药物别名川椒、红椒、蜀椒、大红袍。 英文名称Bunge Pricklyash Peel. 类别果实类 图片来源为芸香科植物花椒Zanthoxylum bungeanum Maxim.的果皮。 采制秋季采收成熟果实，晒干，除去种子及杂质。 植物形态高大灌木或小乔木。小叶5~11，卵形，椭圆形至广卵圆形，长1.5~7cm，宽0.8~3cm，边缘有细圆锯齿，齿缝处有粗大透明腺点；叶轴具狭翅，下面生有向上升的小皮刺。花序顶生；花被片4~8；雄花雄蕊5~7；雌花心皮4~6。果成熟时红色至紫红色，密生疣状突起的油点。花期3~5月，果期7~10月。生长地生于山坡灌木丛中或向阳地、路旁。主产四川、陕西、河北。化学成分含柠檬烯(limonene)、枯醇(cumicalcohol)、龙牛儿醇(geraniol)、植物甾醇、不饱和有机酸。性味归经分果瓣多单生，偶有2个，罕为3个并生，直径4~5mm，果皮由腹面开裂或延伸至背面亦稍开裂；外表面红紫色或红棕色，极皱缩，散有多数疣状突起的油点，直径0.5~1mm；内果皮淡黄色，常由基部与外层果皮分离并向内反卷。香气浓，味麻辣而持久。性温，味辛。功用主治温中止痛，杀虫止痒。用于脘腹冷痛、呕吐泄泻、虫积腹痛、蛔虫症；外治湿疹瘙痒。附注同属植物青椒Z.schinifilium Sieb. Et Zucc.的果皮亦作花椒入药。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)