

玉竹 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/316/2021\\_2022\\_\\_E7\\_8E\\_89\\_E3\\_80\\_80\\_E7\\_AB\\_B9\\_c22\\_316463.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E7_8E_89_E3_80_80_E7_AB_B9_c22_316463.htm) 药品名称玉竹 别名菱蕤、铃铛菜、竹根七、玉竹参 英文名称Fragrant Solomonsal

Rhizome, Rhizoma polygonati Odorati 类别根茎类 性状根茎长圆柱形，略扁，少有分枝。表面黄白色或淡黄棕色，半透明，具纵皱纹及微隆起的环节，有白色圆点状的须根痕，茎痕圆盘状。质硬而脆或稍软，易折断，断面角质样或显颗粒性。气微。味甘，有粘性。图片来源为百合科植物玉

竹 *polygonatum odoratum* (Mill.) Druce 的根茎。采制秋季采挖，除去须根，洗净，晒至柔软后，反复揉搓，晾晒至无硬心，晒干；或蒸透后，揉至半透明，晒干。植物形态多年生草本，高40~65cm。茎具纵棱。叶互生，椭圆形或狭椭圆形。先端钝尖。花序腋生，有1~3花，栽培者可多达8朵；总花梗长1~1.5cm；花被筒状，长1.5~2cm，裂片6，白色或顶端黄绿色；雄蕊6，花丝近光滑至有乳头状突起。浆果熟时蓝黑色。花期4~5月，果期8~10月。生长地生于山野林下或石隙间，喜阴湿处。主产湖南、河南、江苏、浙江；有栽培。化学成分根茎含玉竹粘多糖（odoratan）及4种玉竹果聚糖

（*polygonatum-fructan-O-A, B, C, D*），还含吡啶-2-羧酸（*azetidin-2-carboxylic acid*）等。性味归经性寒，味甘。功用主治养阴润燥，生津止渴。用于肺胃阴伤、燥热咳嗽、咽干口渴、内热消渴。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)