

巴豆 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E5_B7_B4_E8_B1_86_c22_316526.htm 药品名称巴豆 药物别名巴仁、江子、巴果、红子仁。英文名称Croton Fruit 类别果实类 图片来源为大戟科植物巴豆Croton tiglium L.的果实。采制秋季果实成熟时采收，堆置2~3天，摊开，干燥。植物形态常绿小乔木。树皮深灰色，平滑，幼枝绿色，疏生星状毛。叶互生，卵形或长圆状卵形，长5~12cm，宽3~7cm，先端长尖，边缘有细齿，近基部有2腺体，两面疏生星状毛基出3脉。花小，单性同株；总状花序顶生，雄花在上，雌花在下；雄花绿色，花萼5深裂，花瓣5，反卷，雄蕊15~20；雌花无花瓣，子房圆形，花柱3，顶端2叉蒴果卵形，长约2cm，有3钝棱，密生星状毛。种子3粒。花期3~5月，果期7~9月。生长地生于村边、旷野、溪旁、林缘。主产四川、云南、广西、贵州、湖北。化学成分含巴豆油，其中有油酸、亚油酸、巴豆油酸（crotonic acid）、顺芷酸（tiglic acid）等的甘油酯；尚含巴豆甙（crotonoside）。性味归经果实卵圆形，具三棱，长1.8~2.2cm，直径1.4~2cm。表面灰黄色，粗糙，有纵线6条；3室，每室含种子1粒。种子椭圆形，略扁，长1.2~1.5cm，直径0.7~0.9cm；表面棕色或灰棕色，一端有种脐及种阜的疤痕；外种皮薄而脆，内种皮呈白色薄膜；种仁黄白色，油质。味辛辣。性热，味辛；有大毒。功用主治外用蚀疮。用于恶疮疥癣、疣痣。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com