

砂仁 缩砂蜜 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/316/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A0\\_82\\_E4\\_BB\\_81\\_E2\\_94\\_80\\_E7\\_c22\\_316704.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E7_A0_82_E4_BB_81_E2_94_80_E7_c22_316704.htm) 药品名称砂仁 缩砂蜜  
药物别名缩砂、绿壳砂仁。英文名称Cocklebur-lik&#101. Amomum Fruit 类别果实类  
图片来源为姜科植物缩砂蜜Amomum villosum Lour. Var.xanthioides (Wwall.ex Bak.)T.L.Wu et Senjen的果实。采制果实成熟时采摘果穗，置竹帘或水泥地上晒干或用微火烘干。用时取种子。植物形态多年生草本，高1.5~3m。根茎匍匐地面。叶片披针形至线形，长20~35cm，宽3~7cm，两面光滑无毛；叶舌半圆形，长0.3~0.5cm。穗状花序椭圆形；苞片披针形，膜质；小苞片管状，膜质；花白色，顶端具3浅齿；花冠管长1.8cm裂片长1.6~2cm，白色；唇瓣白色，中脉凸起，黄色而染紫红，基部具2个紫色的闸状斑；药隔附属体3裂，两侧耳状；子房被柔毛。蒴果成熟时绿色，果皮上的柔刺较扁。花期5~6月，果期8~9月。生长地生于林下潮湿处。主产云南化学成分含有 $\alpha$ -蒎烯、 $\beta$ -蒎烯、B-蒎烯、 $\beta$ -蒎烯-3、柠檬烯、 $\alpha$ -樟脑、 $\alpha$ -龙脑、乙酸龙脑酯、芳樟醇、 $\alpha$ -胡椒烯、反-B-金合欢烯等。性味归经蒴果类圆形，长1.5~2cm，直径1~1.5cm；外表面黄棕色或棕色，有片状突起。种子团类圆形至长圆形，具钝三棱，每瓣有种子12~24粒；种子多面形；直径约2.5mm，表面棕色或黑棕色，有的外面被一层白霜。气芳香，味辛。性温，味辛。功用主治行气宽中，健胃消食，安胎。用于胸腹胀痛、消化不良、胎动不安等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)