

香加皮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E9_A6_99_E5_8A_A0_E7_9A_AE_c22_316718.htm 药品名称香加皮药物别名北五加皮、香五加 英文名称Chinese Silkvine Root-bark 类别皮类

皮类图片来源为萝藦科植物杠柳Periploca sepium Bunge的根皮。

采制春、秋季挖根，取皮晒干植物形态蔓生灌木，具乳汁。

叶对生，膜质，披针形，长5~9cm，宽1.5~2.5cm，先端

渐尖，基部楔形，全缘，侧脉多对。聚伞花序腋生；花冠紫

红色，裂片5，内部被疏柔毛；副花冠环状，顶端5裂，裂片

丝状，伸长，被柔毛。骨突果双生。种子顶端具白色绢毛。

花期6~7月，果期7~9月。生长地生于山野、河边、砂质地

。主产山西、河南、河北、山东。化学成分含香加皮甙A、B

、C、D、E、F、H、H、K，4-甲氧基水杨醛、-谷甾醇、

香树脂醇等。性味归经根皮呈卷筒状，少数为不规则卷片，

厚2~4mm。外表面灰棕色或黄棕色，栓皮易鳞片状剥落而现

黄白色内皮；内表面淡黄色或红棕色，有细纵纹。质脆，断

面不整洁，淡黄色。有特异香气，味苦。性温，味辛、苦。

功用主治祛风湿，强筋骨。用于风寒湿痹、腰膝酸软、心悸

气短、下肢浮肿。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接

下载。详细请访问 www.100test.com