

梔子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E6_A0_80_E5_AD_90_c22_316764.htm 药品名称梔子 药物别名黄梔子、山枝子、大红梔。英文名称Fructus Gardeniae 类别果实类性状果实椭圆形或长卵圆形，长1.5~3.5cm，直径1~1.5cm。表面红黄色或棕红色，具翅状纵棱5~8条，两棱间有纵脉1条，顶端有宿萼。果皮薄而脆；种子多数，扁长圆形，暗红色或红黄色。气微，味微酸而苦。图片来源为茜草科植物梔子Gardenia jasminoides Ellis的果实。采制9~11月果实成熟显红黄色时采收植物形态常绿灌木，高达2m。叶对生或3叶轮生，叶片革质，长椭圆形或倒卵状披针形，长5~14cm，宽2~7cm，全缘；托叶2片，通常连合成筒状包围小枝。花单生于枝端或叶腋，白色，芳香；花萼绿色，圆筒状；花冠高脚碟状，裂片5或较多；子房下位。花期5~7月，果期8~11月。生长地全国大部分地区有栽培。南方各地有野生，生于山坡、路旁。分布于江西、湖南、浙江、福建、四川。化学成分含梔子甙（geniposide）、羟异梔子甙（gardenoside）、山梔甙（shanzhiside）、梔子新甙（gardoside）、梔子甙酸（geriposidic acid）、梔子黄素（gardenin）、番红花甙-1（crocin-1）、番红花酸（cro-cetin）、鸡矢藤甙甲酯（scandoside methyl ester）等。性味归经性寒，味苦。功用主治泻火除烦，清热利尿，凉血解毒。用于热病心烦、黄疸尿赤、血淋涩痛、血热吐衄、目赤肿痛、火毒疮疡、扭伤。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com