

浙桐皮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E6_B5_99_E6_A1_90_E7_9A_AE_c22_316845.htm 药品名称浙桐皮 药物别名 椿椒、鼓钉树、海桐皮。 英文名称Ailanthus-like.

Pricklyash Bark 类别皮类 图片来源为芸香科植物樗叶花

椒 *Zanthoxylum ailanthoides* Sieb. et Zucc. 的树皮 采制 夏季剥取树皮，将钉刺向内折，晒干。植物形态 乔木，高3~10m，树干和枝有钉刺。单数羽状复叶；小叶9~23，厚纸质，对生，矩圆形至长椭圆形，长7~13cm，宽2~4cm，顶端渐尖，基部圆形，稍不对称，边缘有浅钝锯齿，上面齿缝间有1透明腺点，下面苍绿色，有稀疏腺点。伞房状圆锥花序顶生；花小，单性，淡绿色，5数；雄花雄蕊药隔顶端有1腺点，退化心皮短小。骨突果红色，顶端有短喙。种子棕黑色，有光泽。花期7~8月，果期10~11月。生长地生于密林或路旁湿地。产于浙江 化学成分 树皮含衡州乌药碱（laurifoline）、茵芋碱（skimmianine）及木兰碱（magnoflorine）。性味归经 树皮薄板状或卷曲，厚1.5~3mm。外表面黑灰色或淡黑灰色，并有灰白色斑纹，多皱缩纵条纹及纵向凹纹，有乳头状钉刺；内表面黄棕色，有细密纵纹。质硬脆，断面纤维性。气微，味微苦。性平，味苦。功用主治 祛风湿，通经络。用于腰膝疼痛、顽痹、疥癣。附注 同属植物朵椒 *Z. molle* Rehd. 的树皮同作浙桐皮用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com