

竹叶椒 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/316/2021\\_2022\\_\\_E7\\_AB\\_B9\\_E5\\_8F\\_B6\\_E6\\_A4\\_92\\_c22\\_316848.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E7_AB_B9_E5_8F_B6_E6_A4_92_c22_316848.htm) 药品名称竹叶椒药物别名野花椒、山花椒、单面针。英文名称Fructus Zanthoxyli Planispini 类别果实类性状分果瓣1~2个，衡为3个，直径4~6mm。外表面红棕色或暗棕色，散有多数大而明显突起的油点，直径0.5~1mm。种子卵形，黑色，有光泽，有香气，味微甜而后麻辣。图片来源为芸香科植物竹叶椒Zanthoxylum planispinum Sied. Et Zucc. 的果实。采制熟未开裂时连果序剪下，晒干，将果此取下。植物形态灌木，枝光滑；皮刺对生，基部扁宽。小叶3~7，披针形或椭圆披针形，两端尖，顶端小叶较大，边缘有细小圆锯齿，叶轴及总柄有宽翅和皮刺。花黄绿色；雄花花被片6~8，一轮，雄蕊6~8；雌花心皮2~4，花柱略侧生。蒴果红色。花期5~6月，果期8~9月。生长地生于山坡、丘陵的丛林或荒草中。主产广东、广西、湖南、浙江。化学成分果实含挥发油。性味归经性温，味辛。功用主治散寒，止痛，杀虫。用于脘腹冷痛、寒痰冷喘、湿疹、风湿痹痛。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)