

常山 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E5_B8_B8_E5_B1_B1_c22_316850.htm

药品名称常山 药物别名鸡骨常山、南常山、白常山 英文名称Antifebrile Dichroa Root 类别根类 图片来源为虎耳草科植物黄常山*Dichroa febrifuga* Lour. 的根。采制8~10月挖根，洗净，除去细根，晒干。植物形态落叶灌木，小枝常有4钝棱，疏生黄色短毛。叶对生，椭圆形或倒卵状长圆形，边缘有细锯齿，幼时两面均被棕黄色短毛；叶柄长1.5~5cm，有时疏生短柔毛。伞房状圆锥花序，花序轴与花梗均有毛；花蓝色，萼筒5~6齿裂；花瓣5~6，反折；雄蕊10~20，花柱4~6，初时基部连合。浆果几完全下位，深蓝色，有宿存萼齿和花柱。花期5~7月，果期8~9月。生长地生于林下、路旁或溪边。主产四川、贵州。化学成分含多种生物碱，常山碱甲、乙、丙（-，-，-dichroine）、常山次碱（dichroidine）、4-喹唑酮（4-quinazolone），尚含常山素A（dicnirin A，umbeli-ferone）、常山素B（dictirin B）。性味归经根圆柱形，常弯曲扭转，或有分枝，长9~15cm，直径0.5~2cm，表面棕黄色，具细纵纹，外皮易剥落，剥落处露出淡黄色木部。根上端有根茎。质坚硬，横切面黄白色，射线类白色；中心有白色髓部或成空洞。无臭，味苦。性寒，味辛、苦。功用主治截疟，祛痰。用于疟疾。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com