

柿蒂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/316/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9F\\_BF\\_E8\\_92\\_82\\_c22\\_316856.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E6_9F_BF_E8_92_82_c22_316856.htm)

药品名称柿蒂 英文名称Prsimmon

类别果实类 图片来源为柿树科植物柿 *Diospyros kaki* L. f.

果实的宿萼。采制冬季果实成熟时采摘或食用时收集，洗净，晒干。植物形态落叶乔木，小枝有褐色柔毛。叶互生，革质，卵状椭圆形至倒卵形，长6~18cm，宽3~9cm，先端短尖，全缘，上面深绿色，下面有褐色短柔毛；花杂性，雄花有雄蕊16，成短聚伞花序；雌花单生于叶腋，子房上位，8室；花萼4深裂，有毛，果熟时增大；花冠黄白色，4裂，有毛。浆果扁圆形或卵圆形，直径3.5~8cm，熟时橙红色、红色、鲜黄色，宿存花萼木质。花期5~6月，果期9月。生长地全国各地均有栽培。主产河南、山东。化学成分含齐墩果酸

(oleanolic acid)、熊果酸(ursolic acid)、白桦脂酸(betulic acid)、丁香酸(syringic acid)、香草酸(vanillic acid)、B-谷甾醇及其糖甙(B-sitosterol-B-glucoside)、三叶豆甙

(trifolin)、金丝桃甙(hyperin)、山柰酚(kaempferol)等

。性味归经宿萼皿状，萼筒部平展，类方形，直径1~1.5~2.5cm，边缘4裂，裂片宽三角形，长1~1.5cm，宽约2cm，常向外反卷，基部有果柄或圆形果柄痕；外表面红棕色，内表面黄棕色，萼筒密生锈色有光泽的短绒毛，作放射状排列。

质硬脆。味微涩。性平，味苦、涩。功用主治降逆下气。

用于呃逆。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)