

肉桂锡兰肉桂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E8_82_89_E6_A1_82_E2_80_94_E9_c22_316874.htm 药品名称肉桂锡兰肉桂
英文名称Caylon Cinnamon Bark 类别皮类性状本品呈卷筒状或槽状，厚约5mm，外表面棕色，有不规则的细纵皱及突起的皮孔；内表面棕色，平坦，划之显油痕。质脆，易折断，断面不平坦。气香，味微辣。图片来源为樟科植物锡兰肉桂Cinnamomum zeylanicum B1.的树皮。采制秋季剥取，阴干。植物形态常绿乔木，高可达10m。幼枝略为四棱形，灰色而具白斑。叶革质或近革质，通常对生，卵形或卵状披针形，下面呈蜂窝状；叶柄长2cm，无毛。花序腋生或顶生，长10~20cm，被绢状毛；花黄色，长约6mm，花被裂片外面被灰色微柔毛。果卵形，长1~1.5cm，黑色，果托杯状，具6齿裂，齿端截形或锐尖。花期1~3月，果期8~9月。生长地生于热带海拔1000m以下的潮湿地带。我国海南、福建、台湾有栽培。化学成分含挥发油，油中含桂皮醛（cinnamaldehyde）、丁香酚（eugenol）等，并含鞣质及粘液质。性味归经与肉桂类同。附注主产于斯里兰卡的锡兰桂皮系锡兰肉桂的内皮，常10~40薄片重叠卷成细长筒状或双筒状，每片厚约0.5mm，外表面黄棕色，平滑，有波状纵线纹。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com