

金樱子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E9_87_91_E6_A8_B1_E5_AD_90_c22_316915.htm 药品名称金樱子 药物别名糖罐子、野石榴、糖钵、刺梨 英文名称Fructus Rosae Laevigatae 类别果实类性状药材为花托和雌蕊发育而成的假果，倒卵形，长2~3.5cm，直径1~2cm。表面红黄色或红棕色，有突起的棕色点状毛刺残基。顶端有盘状花萼残基，中间有黄色柱基，下部渐尖。质硬，切开后内表面密生淡黄色有光泽的绒毛，内含小瘦果30~50粒，瘦果扁纺锤形，无臭，味甘、微涩。图片金樱子来源为蔷薇科植物金樱子Rosa laevigata Michx.的果实。采制10~11月果实成熟变红时采摘，干燥，除去毛刺。植物形态常绿攀援状灌木。枝密生倒钩状皮刺和刺毛。三出复叶互生；小叶椭圆状卵形至卵状披针形，长3~7cm，宽1~5cm，先端尖，边缘有细锐锯齿，下面沿中脉有刺；托叶线状披针形。花单生于侧枝顶端；萼片5，卵状披针形，被腺毛，宿存；花瓣5，白色，倒广卵形；雄蕊多数；雌蕊多数，被绒毛，包于花托内。蔷薇果熟时红色，梨形，外有刚毛，内有多数瘦果。花期5~6月，果期9~10月。生长地生于向阳多石山坡灌丛中。主产江苏、安徽、浙江、江西、福建、涌南、广东、广西。化学成分含皂甙、糖类、逆没食子酸(ellagic acid)、B-谷甾醇等。性味归经性平，味酸、甘、涩。功用主治固精缩尿，涩肠止泻。用于遗精滑精、遗尿尿频、崩漏带下、久泻久痢。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com