

紫草新疆紫草 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/316/2021\\_2022\\_\\_E7\\_B4\\_AB\\_E8\\_8D\\_89\\_E2\\_80\\_94\\_E6\\_c22\\_316939.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E7_B4_AB_E8_8D_89_E2_80_94_E6_c22_316939.htm) 药品名称紫草新疆紫草  
药物别名软紫草 英文名称Arnebia Root 类别根类图片来源  
为紫草科植物新疆紫草Arnebia euchroma(Royle) Johnst. 的根。  
采制春、秋季采挖，晒干或微火烘干。植物形态多年生草本，高15~35cm。全株被白色硬糙毛。根圆锥形，多扭曲，紫色栓皮多层。茎竖立，单一或基部分成二歧。基生叶丛生，叶条状披针形，长约13cm，全缘，黄绿褐色；茎生叶互生，较少，短小。花集结成聚伞花序，密生于茎顶，近于头状；苞片条状披针形；花无梗，花萼短筒状，5深裂；花冠紫色，长筒形漏斗状，管部与花萼裂片近于等长，先端5裂，裂片椭圆形，喉部与基部光滑；雄蕊5，着生于花冠管中部，花丝极短或无；子房4深裂，花柱细长，柱头球状。小坚果骨质，宽卵形，淡褐色，表面有疣状突起。花期6~8月，果期8~9月。生长地生于山地阳坡草丛中。主产新疆、西藏。化学成分含紫草素(shikonin)及其多种衍生物。性味归经根呈不规则的长圆柱形，多扭曲，长7~20cm，直径1~2.5cm。表面紫红色或紫褐色，皮部疏松，呈条片状，常10余层重叠，易剥落。顶端有的可见分歧的茎残基。体轻，质松软，易折断，断面不整洁，黄白色或黄色。气特异，味微苦、涩。功用主治同紫草。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)