

牡丹皮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E7_89_A1_E4_B8_B9_E7_9A_AE_c22_316961.htm 药品名称牡丹皮 药物别名丹皮、粉丹皮、木芍药、洛阳花。英文名称Tree Peony Bark 类别皮类 性状根皮呈筒状或半筒状，有纵剖开的裂缝，两边向内卷曲，长5~20cm，直径0.5~1.2cm。外表面褐色或黄褐色，有横长皮孔及细根痕，栓皮脱落处显粉红色；内表面淡灰黄色或浅棕色，有细纵纹，常见发亮的结晶。质硬脆，断面较平坦，粉性，淡粉红色。气芳香，味微苦而涩。图片来源为毛茛科植物牡丹*Paeonia suffruticosa* Sndr.的粗皮。采制秋季挖根，剥取根皮，晒干。植物形态落叶灌木二回三出复叶，顶生小叶长达10cm，3裂近中部，裂片上产3浅裂或不裂，侧生小叶较小，斜卵形，不等2浅裂或不裂，上面绿色，下面有白粉，中脉有疏毛或近无毛。花单生枝顶，萼片5；花瓣5，或重瓣，白色、红紫色或黄色，倒卵形，先端常2浅裂；雄蕊多数；花盘杯状，红紫色，包住心皮，在心皮成熟时裂开；心皮5，密生柔和。骨朵果卵形，密生褐黄色毛。花期5~7月，果期7~8月。生长地全国广为栽培。主产安徽、四川、甘肃、陕西、湖北、湖南、山东、贵州。化学成分含牡丹皮原甙（paeonolide）、牡丹酚（paeonol）、芍药甙（paeoniflorin）、羟基芍药甙、苯甲酰芍药甙及挥发油。性味归经性寒，味苦、辛。功用主治清热凉血，活血行瘀。用于温毒发斑、吐、衄、便血，骨蒸劳热，经闭痛经，痈肿疮毒，跌扑伤痛。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com