

五加皮 白勒 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/316/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_94\\_E5\\_8A\\_A0\\_E7\\_9A\\_AE\\_E2\\_c22\\_316983.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E4_BA_94_E5_8A_A0_E7_9A_AE_E2_c22_316983.htm) 药品名称五加皮  
白勒药物别名鹅掌楸、三叶五加、刺三甲。英文名  
称Acanthopanax Trifoliate Root-bark 类别皮类图片来源为五加  
科植物白？Acanthopanax trifoliatum (L.) Merr. 的根皮。采制夏  
、秋季采挖根部，洗净，剥取根皮，晒干。植物形态攀援状  
灌木，高1~7m，枝疏生向下的钩刺。掌状复叶，小叶3，很  
少4~5，中心的1片较大，椭圆状卵形至长椭圆形，长2~8cm  
，宽1.5~4cm，先端尖或短渐尖，基部楔形，边缘有锯齿，  
两面无毛或仅沿叶脉疏生刺毛；总叶柄长2~5cm，疏生钩刺  
。伞形花序3~10个生于小枝顶端，很少单生，花萼有5齿；  
花瓣5，黄绿色；雄蕊5；子房2室，花柱2，合生至中部。果  
实扁球形，成熟时黑色。花期8~9月，果期10月。生长地生  
于山坡、林边、灌丛中。分布于北起秦岭南坡，但在长江中  
下游北界约为北纬31°，向南各地均产。化学成分含异贝壳  
杉烯酸（kaurenoic acid）、-谷甾醇。功用主治同细柱五加  
。附注根皮呈不规则筒状，稍弯曲，厚0.5~1mm。外表面灰  
红棕色，皮孔较小，类圆形或略横向延长，长0.8~3.5mm，  
直径0.5~1mm；内表面灰褐色。折断面有棕色点状树脂道，  
可见其中的亮黄棕色油树脂。气微香，味微辛、苦。100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)