

浙桐皮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/317/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B5\\_99\\_E6\\_A1\\_90\\_E7\\_9A\\_AE\\_c22\\_317102.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E6_B5_99_E6_A1_90_E7_9A_AE_c22_317102.htm) 药品名称浙桐皮 药物别名 椿椒、鼓钉树、海桐皮。英文名称Ailanthus-lik#101.

Pricklyash Bark 类别皮类 性状树皮薄板状或卷曲，厚1.5~3mm。外表面黑灰色或淡黑灰色，并有灰白色斑纹，多皱缩纵条纹及纵向凹纹，有乳头状钉刺；内表面黄棕色，有细密纵纹。质硬脆，断面纤维性。气微，味微苦。图片来源为芸香科植物樗叶花椒*Zanthoxylum ailanthoides* Sieb.et Zucc.的树皮。采制夏季剥取树皮，将钉刺向内折，晒干。植物形态乔木，高3~10m，树干和枝有钉刺。单数羽状复叶；小叶9~23，厚纸质，对生，矩圆形至长椭圆形，长7~13cm，宽2~4cm，顶端渐尖，基部圆形，稍不对称，边缘有浅钝锯齿，上面齿缝间有1透明腺点，下面苍绿色，有稀疏腺点。伞房状圆锥花序顶生；花小，单性，淡绿色，5数；雄花雄蕊药隔顶端有1腺点，退化心皮短小。骨突果红色，顶端有短喙。种子棕黑色，有光泽。花期7~8月，果期10~11月。生长地生于密林或路旁湿地。产于浙江。化学成分树皮含衡州乌药碱

(laurifoline)、茵芋碱(skimmianine)及木兰碱(magnoflorine)。性味归经性平，味苦。功用主治祛风湿，通经络。用于腰膝疼痛、顽痹、疥癣。附注同属植物朵椒*Z.molle* Rehd.的树皮同作浙桐皮用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)