

苦楝皮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/317/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8B\\_A6\\_E6\\_A5\\_9D\\_E7\\_9A\\_AE\\_c22\\_317154.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E8_8B_A6_E6_A5_9D_E7_9A_AE_c22_317154.htm) 药品名称苦楝皮 英文名称Chinaberry-Tree Bark 类别皮类性状树皮不规则板片状、槽状或半卷筒状，长宽不一，厚2~6mm。外表面灰棕色或灰褐色，粗糙，除去粗皮者淡黄色；内表面类白色或淡黄色。质韧，不易折断，断面纤维性，呈层片状，易剥离。无臭，味苦。图片来源为楝科植物楝Melia azedarach L.的干皮和根皮。采制春、秋季割取，晒干，或除去粗皮，晒干。植物形态落叶乔木。树皮纵裂，幼枝被星状柔毛。叶互生，2~3回羽状复叶，小叶卵形至椭圆形，长3~7cm，宽2~3cm，先端长尖，边缘具深浅不一的钝齿，幼时被星状毛，后仅沿脉有白毛。圆锥花序腋生；花萼5裂，被毛；花瓣5，淡紫色，外面被毛；雄蕊10；子房上位，4~5室。核果近球形，直径1~1.5cm，黄棕色，有光泽。花期5月，果期10月。生长地生于山坡、田野或栽培。产于华北、华东、中南及西南各地。化学成分含苦楝素、苦楝萜酮内酯(kulactone)、苦楝萜醇内酯(kulolactone)、苦楝皮萜酮(kulinone)、苦楝萜酸甲酯(methyl kulonate)、川楝素(toosendanin)等。性味归经性寒，味苦。功用主治驱虫疗癣。用于蛔虫病、虫积腹痛；外治疥癣瘙痒。附注商品苦楝皮还包括川楝M. toosendan Sieb.et Zucc.的干皮或根皮。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)