

千金子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E5_8D_83_E9_87_91_E5_AD_90_c22_317172.htm 药品名称千金子 药物别名小巴豆、续随子。英文名称Caper Euphorbia Seed 类别种子类 图片来源为大戟科植物续随子Euphorbia lathyris L.的种子。采制秋季种子成熟后，割取植株，打下种子，除去杂质，晒干。植物形态二年生草本，有乳汁，全株被白粉。茎竖立，圆柱形。茎下部叶密生，线状披针形，上部叶对生，广披针形，先端渐尖，基部近心形。总花序顶生，呈伞状，伞梗2~4，基部有2~4叶轮生；每梗再叉状分枝，有三角状卵形苞片2，每分叉间生1杯状聚伞花序；总苞杯状，先端4~5裂，腺体4，新月形。蒴果球形。花期6~7月，果期8月。生长地生于向阳山坡；多为栽培。主产河南、浙江。化学成分种子椭圆形或卵圆形，长3~4mm，直径2~4mm。表面灰含巨大戟二萜醇3-十六烷酸酯(ingenol 3-hexadecanoate)、7-羟基千金二萜醇(7-hydroxylathyrol)、-大戟甾醇(-euphol)、-大戟烯醇(-euphorbol)、七叶内酯(aesculetin)、七叶甙(aesculin)、续随二萜酯(euphorbiasteroid)、瑞香素(daphnetin)、山柰酚-3-葡萄糖醛酸甙(kaempferol-3-glucuronide)等。性味归经性温，味辛；有小毒 功用主治行水消肿，破血散瘀。用于水肿、痰饮积滞胀满、二便不通、血瘀闭经。附注种子椭圆形或卵圆形，长3~4mm，直径2~4mm。表面灰棕色，有网状皱纹，皱纹凹下部灰黑色，形成细斑点，一侧具有沟状种脊，顶端有圆形微突起的合点，基部有类白色突起的种脊。味辛。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

