五加皮 白勒 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/317/2021\_2022\_\_E4\_BA\_94\_ E5 8A A0 E7 9A AE E2 c22 317174.htm 药品名称五加皮 白勒药物别名鹅掌楸、三叶五加、刺三甲。 英文名 称Acanthopanax Trifoliate Root-bark 类别皮类性状根皮呈不规 则筒状,稍弯曲,厚0.5~1mm。外表面灰红棕色,皮孔较小 , 类圆形或略横向延长, 长0.8~3.5mm, 直径0.5~1mm; 内 表面灰褐色。折断面有棕色点状树脂道,可见其中的亮黄棕 色油树脂。气微香,味微辛、苦。图片来源为五加科植物白 ? Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr. 的根皮。采制夏、秋季采 挖根部,洗净,剥取根皮,晒干。植物形态攀援状灌木,高1 ~7m, 枝疏生向下的钩刺。掌状复叶,小叶3,很少4~5,中 心的1片较大,椭圆状卵形至长椭圆形,长2~8cm,宽1.5 ~ 4cm, 先端尖或短渐尖, 基部楔形, 边缘有锯齿, 两面无 毛或仅沿叶脉疏生刺毛;总叶柄长2~5cm,疏生钩刺。伞形 花序3~10个生于小枝顶端,很少单生,花萼有5齿;花瓣5, 黄绿色;雄蕊5;子房2室,花柱2,合生至中部。果实扁球形 ,成熟时黑色。花期8~9月,果期10月。生长地生于山坡、 林边、灌丛中。分布于北起秦岭南坡,但在长江中下游北界 约为北纬31°,向南各地均产。化学成分含异贝壳杉烯酸 (kaurenoic acid)、一谷甾醇。性味归经同细柱五加。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com