

空心莲子草 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E7_A9_BA_E5_BF_83_E8_8E_B2_E5_c22_317202.htm 药品名称空心莲子草
药物别名水花生、喜旱莲子草、空心苋。英文名称Alligator
alt#101.rnanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.的地上部分。采
制10~11月采收，除去杂质，洗净，晒干或鲜用。植物形态
多年生宿根草本。茎基部匍匐、上部伸展，中空，有分枝，
节腋处疏生细柔毛。叶对生，长圆状倒卵形或倒卵状披针形
，先端圆钝，有芒尖，基部渐狭，表面有贴生毛，边缘有睫毛。
头状花序单生于叶腋，总花梗长1~6cm；苞片和小苞片
干膜质，宿存；花被片5，白色，不等大；雄蕊5，基部合生
成杯状，退化雄蕊顶端分裂成3~4窄条；子房倒卵形，柱头
头状。花期5~11月。生长地生于池沼、水沟。原产巴西；北
京、江苏、浙江、江西等地引种，后逸为野生。化学成分含
黄酮甙、三萜皂甙、有机酸、酚性成分、香豆素、糖、脂肪
、蛋白质、6-甲氧基木犀草素、7-a-L-鼠李糖甙（7-a-L
-rhamnosy 1-6-methoxyluteolin）及藤菊黄素（patuletin）。性
味归经性寒，味苦。功用主治清热，凉血，解毒。用于流行
性乙型脑炎早期、流行性出血热初期、麻疹。100Test 下载频
道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com