

红花 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E7_BA_A2_E8_8A_B1_c22_317268.htm

药品名称红花 药物别名草红、刺红花、杜红花、金红花。英文名称Safflower 类别花类 图片来源为菊科植物红花 *Carthamus tinctorius* L. 的管状花。采制夏季花橙红时采摘，阴干、晒干或烘干。植物形态一年生草本，高约1m。茎竖立，上部多分枝。叶长椭圆形，先端尖，无柄，基部抱茎，边缘羽状齿裂，齿端有尖刺，两面无毛；上部叶较小，成苞片状围绕状花序。头状花序顶生，排成伞房状；总苞片数层，外层绿色，卵状披针形，边缘具尖刺，内层卵状椭圆形，白色，膜质；全为管状花，初开时黄色，后转橙红色；瘦果椭圆形，长约5mm，无冠毛，或鳞片状。花期5~7月，果期7~9月。生长地全国各地均有栽培。化学成分含红花甙 (carthamin)、新红花甙 (neocarthamin)、红花醌甙 (carthamone)、红花多糖、棕榈酸、肉桂酸、月桂酸。性味归经管状花长1~2cm，表面红黄色或红色；花冠筒细长，先端5裂，裂片狭条形，长5~8mm；雄蕊5，花药聚合成筒状，共同白色；柱头细长圆柱形，顶端微分叉。质柔软。气微香，味微苦。性温，味辛。功用主治活血通经、散瘀止痛。用于经闭、痛经、恶露不行、症瘕痞块、跌打损伤。附注果实称白平子，含红花子油，油能降胆固醇和高血脂；软化和扩张血管，抗衰老，调节内分泌。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com