

苘麻子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E8_8B_98_E9_BA_BB_E5_AD_90_c22_317283.htm 药品名称苘麻子药物别名冬葵子、青麻、葵子、白麻。英文名称Chingma Abutilon Seed 类别种子类图片来源为锦葵科植物苘麻Abutilon theophrasti Medic.的种子。采制秋季采收成熟果实，晒干，打下种子。植物形态一年生草本，高0.3~2m，全株密生绒毛状星状毛。叶互生，圆心脏形，直径7~18cm，先端长尖，边缘具粗锯齿，叶脉掌状；叶柄长。花单生于叶腋，花萼5裂，绿色；花瓣5，黄色，倒卵形，顶端平凹，基部与雄蕊筒合生；雄蕊多数，花丝基部连合成筒；心皮15~20，环列成扁球形，先端突出如芒。果实半圆球形似磨盘，密生星状毛，成熟后形成分果。种子黑色。花期7~10月，果期10~11月。生长地生于路旁、田野或栽培。主产四川、湖北、河南、江苏。化学成分含脂肪油，油中主成分为亚油酸、油酸、亚麻酸、棕榈酸、硬脂酸、花生酸。性味归经种子三角状肾形，长3.5~6mm，宽2.5~4.5mm，厚1~2mm。表面灰黑色或暗褐色，有白色稀疏绒毛，凹陷处有类椭圆状种脐，淡棕色，四面有放射状细纹。种皮坚硬，子叶2，重叠折曲。气微，味淡。性平，味苦。功用主治清热利湿，解毒，退翳。用于赤白痢疾、淋病涩痛、痈肿目翳。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com