

枳椇子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E6_9E_B3_E5_85_B7_E5_AD_90_c22_317328.htm 药品名称枳椇子 药物别名拐枣、鸡爪梨、鸡矩子。英文名称Japanese Raisin Tree Seed 类别种子类 图片来源为鼠李科植物枳椇 *Hovenia dulcis* Thunb. 的种子。采制10~11月果实成熟时连肉质花序轴一并摘下，晒干，取出种子。植物形态落叶乔木。叶互生，广卵形，长8~15cm，宽6~10cm，先端渐尖或长尖，基部圆满呈心形，边缘有粗锯齿；叶柄红褐色。聚伞花序腋生或顶生，花杂性，同株；萼5；花瓣5，黄绿色，两侧卷起，包裹雄蕊；雄花有雄蕊5，有退化子房；两性花有雄蕊5，子房埋没于花盘中，3室，柱头3裂。果实圆形或广椭圆形，生于肉质扭曲的花序轴上。花期5~6月，果期10月。生长地生于沟边、路边或山谷中。主产陕西、湖北、浙江、江苏、安徽、福建。化学成分含葡萄糖、果糖、硝酸钾、过氧化物酶等。性味归经种子扁平圆形，背面稍隆起，腹面较平坦，直径3~5mm，厚1~1.5mm。表面红棕色、棕黑色或绿棕色，有光泽，于放大镜下可见散在凹点，基部凹陷处有点状淡色种脐，顶端有微凸的合点，腹面有纵行隆起的处脊。种皮坚硬，胚乳乳白色，子叶淡黄色。味微涩。性平，味甘。功用主治止渴除烦，消湿热，解酒毒。用于中酒毒、烦渴呕逆、二便不利。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com