

泡桐花 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/317/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A1\\_E6\\_A1\\_90\\_E8\\_8A\\_B1\\_c22\\_317330.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E6_B3_A1_E6_A1_90_E8_8A_B1_c22_317330.htm)

药品名称泡桐花 药物别名日本泡桐、桐。 英文名称Royal Paulownia Flower 类别花类

图片来源为玄参科植物泡桐Paulownia tomentosa (Thunb.)

Steud.的花。采制春季开花时采收，干燥。植物形态落叶乔木

，高4~15m，幼枝、幼果密被粘质短腺毛，后变光滑。叶对生，宽卵形至卵形，长12~30cm，宽10~30cm，先端渐尖，基部心形，全缘，有时浅3裂，上面有柔毛及腺毛，下面密被星状绒毛，新发的幼叶有粘性短腺毛；叶柄长3~15cm。聚伞圆锥花序的侧枝不很发达；花萼钟形，5裂至中部，裂片卵形，有锈色绒毛；花冠漏斗状钟形，筒部扩大，驼曲，紫色或淡紫色，内有黑色斑点及黄色条纹，外有毛茸。蒴果卵圆形，长3~4cm，顶端尖如喙，外果皮硬革质。花期4~5月。生长地喜生于排水良好的沙质土。分布于华东、中南、西南。

化学成分含熊果酸(ursolic acid)、莪果萜酚(matteucinol)

。性味归经多皱缩折迭，长4~7.5cm。花萼长约1.2cm，裂片长约占1/2，卵状长圆形；花冠灰棕色，内面紫色斑点众多，下唇有2条黄色纵褶；雄蕊长约至2.5cm，花柱长约4cm。性寒，味微苦。功用主治清热解毒。用于支气管炎、急性扁桃体炎、菌痢、急性肠炎、急性结膜炎、肋腺炎、疔肿。附注：

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)