

三七 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E4_B8_89_E4_B8_83_c22_317418.htm 药品名称三七 药物别名人参三七、田七、盘龙七、金不换 英文名称Sanchi 类别根类 图片来源为五加科植物三七Panax notoginseng(Burk.) F.H.Chen的根。采制种后第3年冬季及夏末初秋采挖。去须根，曝晒至半干，用于搓揉，再曝晒，重复数次，置麻袋中加蜡打光。植物形态多年生草本，高达60cm。根茎短，茎竖立，光滑无毛。掌状复叶，具长柄，3~4片轮生于茎顶；小叶3~7，椭圆形或长圆状倒卵形，边缘有细锯齿。伞形花序顶生，花序梗从茎顶中心抽出，长20~30cm。花小，黄绿色；花萼5裂；花瓣、雄蕊皆为5。核果浆果状，近肾形，熟时红色。种子1~3，扁球形。花期6~8月，果期8~10月。生长地生于山坡丛林下。现多栽培于海拔800~1000m的山脚斜坡或土丘缓坡上。主产云南、广西、四川。化学成分含皂甙，主要为人参皂甙Rb1、Rg1、Rg2和少量人参皂甙Ra、Rb2、Rb和Re。此外，尚含黄酮甙、淀粉、蛋白质、油脂等。性味归经性温，味甘、微苦。功用主治散瘀止血，消肿定痛。用于各种内、外出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。附注根圆锥形、纺锤形或不规则块状，长1.5~5cm，直径1.2~2cm。表面灰黄色或棕黑色，具蜡样光泽，有不规则细纹及少数横长皮孔；上部有数个瘤状隆起的支根断痕，顶端残留根茎基。质坚实，击碎后皮部与木部常分离；横切面灰白色或黄棕色，皮部有棕色小点（树脂道），味苦、微甜。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com