

木鳖子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/317/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9C\\_A8\\_E9\\_B3\\_96\\_E5\\_AD\\_90\\_c22\\_317428.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E6_9C_A8_E9_B3_96_E5_AD_90_c22_317428.htm) 药品名称木鳖子 药物别名漏苓子、藤桐子、木鳖。英文名称Cochinchina Momordica Seed 类别种子类 图片来源为葫芦科植物木鳖子Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 的种子采制冬季采收成熟果实，剖开，晒至半干，除去果肉，取出种子，干燥。植物形态多年生草质藤本。茎有棱，无毛，卷须单一，与叶对生。叶互生，圆心形，直径7~14cm，3~5中裂或深裂，偶有7裂，裂片卵形或长卵形；叶柄顶端或叶片基部有2~5腺体。花单性同株；雄花梗细长，每花具1大苞片，花萼黑褐色，有黄白色斑点，花冠浅黄白色；雌花梗短，苞片较小。瓠果长椭圆形，长9~15cm，熟时红色，表面有软质刺突。种子暗黑色。花期6~8月，果期8~11月。生长地生于山坡林下或灌丛中。主产湖北、广西、四川。化学成分含木鳖子酸(momordic acid)、丝石竹皂甙元(gypsogenin)、齐墩果酸(oleanolic acid)、-桐酸(-elaeostearic acid)、气基酸、甾醇。性味归经种子扁平圆板状，中间稍隆起或微凹下，直径2~4cm，厚约0.5cm/表面灰棕色至黑褐色，有网状花纹，在边缘较大的一个齿状突起上有浅黄色种脐。外种皮质硬而脆，内种皮灰绿色，绒毛样。子叶2，黄白色，富油性。有非凡的油膩气，味苦。性温，味苦，微甘；有毒。功用主治散结消肿，攻毒疗疮。用于疮疡肿毒、乳痛、瘰疬、痔漏、干癣、秃疮。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)