

半枝莲 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/317/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8D\\_8A\\_E6\\_9E\\_9D\\_E8\\_8E\\_B2\\_c22\\_317481.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E5_8D_8A_E6_9E_9D_E8_8E_B2_c22_317481.htm) 药品名称半枝莲药物别名并头草、狭叶韩信草、牙刷草。英文名称Barbed Shullcap Herb 类别全草类图片来源为唇形科植物半枝莲*Scutellaria barbata* D.Don的全草。采制夏、秋季茎叶繁茂时采收，洗净，晒干植物形态多年生草本，高15~50cm。茎方形，无毛。叶对生，三角状卵形或卵状披针形，长0.7~3.2cm，宽0.4~1.5cm，基部截形或圆形，边缘具波状疏钝齿，下面有腺点；叶柄短或近无。花单生于茎或分枝上部叶腋，成偏侧总状花序；花萼紫色，长约2mm，上唇背部盾片高约1mm，果时增大；花冠蓝紫色，长约1.3cm，冠筒基部前方囊状，下唇中裂片梯形；雄蕊4，二强。小坚果扁球形，具瘤。花期5~10月，果期6~11月。生长地生于田边、路旁。主产河北、山西、陕西、安徽、江苏、浙江、江西、湖北、四川、贵州、福建、广东、云南、台湾。化学成分含野黄芩素（scutellarein）、野黄芩甙（scutellarin）、红花素（carthamidin）、异红花素（isocarthamidin）及生物碱。性味归经性寒，味辛、苦。功用主治清热解毒，化瘀利尿。用于疗疮肿毒、咽喉肿痛、毒蛇咬伤、跌扑伤痛、水肿、黄疸。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)