

败酱草 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/317/2021\\_2022\\_\\_E8\\_B4\\_A5\\_E9\\_85\\_B1\\_E8\\_8D\\_89\\_c22\\_317487.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E8_B4_A5_E9_85_B1_E8_8D_89_c22_317487.htm)

药品名称败酱草药物别名败酱。英文名称Whiteflower Patrinia Herb 类别全草类图片来源为败酱科植物白花败酱*Patrinia villosa* Juss. 的全草。采制夏季开花前采挖，晒至半干，扎成束，再阴干植物形态多年生草本，高达1m。地下茎细长，地上茎竖立，密被白色倒生粗生或仅两侧各有1列倒生粗毛。基生叶簇生，卵圆形，边缘有粗齿，叶柄长；茎生叶对生，卵形或长卵形，长4~10cm，宽2~5cm，先端渐尖，基部楔形，1~2对羽状分裂，基部裂片小；上部不裂，边缘有粗齿，两面有粗毛，近无柄。伞房状圆锥聚伞花序，花序分枝及梗上密生或仅2列粗毛；花萼不明显；花冠白色，直径4~6mm。瘦果倒卵形，基部贴生在增大的圆翅状膜质苞片上，苞片近圆形。花期5~6月。生长地生于山坡草地、路旁。除西北外，全国均有分布。化学成分含白花败酱甙（villoside）、莫罗忍冬甙（morroniside）、番木鳖甙（loganin）等。性味归经性凉，味辛、苦。功用主治清热解毒，祛瘀排脓。用于阑尾炎、痢疾、肠炎、肝炎、眼结膜炎、产后瘀血腹痛、痈肿疔疮。附注同属植物黄花败酱*P.scabiosaefolia* Fisch.同作败酱草使用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)