

木槿花 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/317/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9C\\_A8\\_E6\\_A7\\_BF\\_E8\\_8A\\_B1\\_c22\\_317498.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E6_9C_A8_E6_A7_BF_E8_8A_B1_c22_317498.htm) 药品名称木槿花 药物别名白槿花、桐树花、大碗花。英文名称Flos

Hibisci,Shrubalthea Flower 类别花类 性状花呈不规则形，长1.5~3cm，宽1~1.5cm，基部钝圆，柄短，苞片一轮。花萼灰绿色，裂片卷缩或反卷；花柄、苞片、花萼外均有细毛；花瓣10枚，皱折，淡黄或淡紫蓝色，倒卵形，基部密生白色长柔毛；雄蕊合生成蕊柱，花药多数，呈紫黑色。气微，味淡。图片来源为锦葵科植物木槿*Hibiscus syriacus* L.的花。采制夏、秋季花初开放时采收，晒干。植物形态落叶灌木，高3~4m。茎多分枝，幼枝密被黄色星状毛及茸毛。叶互生，卵形或菱状卵形，长4~7cm，宽2~4cm，不裂或中部以上3裂，基部楔形，边缘有钝齿。花大，单生叶腋，直径5~6cm，花柄长4~14mm；小苞片6~7，线形，有星状毛；花萼钟形，5裂，有星状毛及短柔毛；花瓣白色、红色、淡紫色等，常重瓣；雄蕊和柱头不伸出花冠。蒴果长圆形，长约2cm，顶端有短喙，密生星状毛。种子褐色。花期7~10月，果期9~10月。生长地全国有栽培。化学成分含皂草黄甙

(saponarin)、肌醇(inositol)、粘液质。性味归经性寒，味苦。功用主治清热解毒。用于痢疾、腹泻、白带。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)