

郁李仁 长梗郁李 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E9_83_81_E6_9D_8E_E4_BB_81_E2_c22_317521.htm 药品名称郁李仁 长梗郁李

药物别名赤李子、侧李子。英文名称Chinese Bushcherry Seed 类别种子类图片来源为蔷薇科植物长梗郁李 *Prunus japonica* Thunb. var. *nakai* (Levl.) Rehd. 的种子。采制秋季采集成熟果实，搓去果肉，冲洗干净，除去果壳，取出种子。植物形态落叶灌木。树皮灰褐色，有不规则的纵条纹。叶互生，卵状披针形，长3~6cm，宽1.5~3cm，先端尾状渐尖，基部圆形，边缘有尖锐重锯齿；叶柄较长；托叶2，线形，早落。花先叶开放，单生或2~3簇生，花梗长1~2cm；萼筒陀螺形，萼片5枚；花瓣5，浅红色或白色，倒卵状椭圆形；雄蕊多数，花药不等长；雌蕊1，子房长圆形。核果近球形，熟时鲜红色，果柄长1~2cm。花期4~6月，果期7~8月。生长地生于山坡、路旁、林边。主产黑龙江、辽宁、吉林。化学成分含苦杏仁甙（amygdalin）、脂肪油、挥发性有机酸、皂甙、郁李仁甙（prunuside）等。性味归经种子呈卵圆形，长5~7mm，宽3~5mm。表面黄棕色，一端尖，一侧有线性种脐；另一端钝圆。中心有深色合点，自合点处向上具多条纵向维管束脉纹。种皮薄，易剥落，子叶2，乳白色，富油性。气微，味微苦。功用主治同欧李 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com